Perth Children's Hospital

Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

متى يتم اختبار الكيتونات

1

الشعور بالإعياء

أو



مستوى الجلوكوز أعلى من 15

2

افحص الكيتونات في الدم

3

إذا كانت الكيتونات

↑ أعلى من نسبة 0.6

- اتبع دليل إدارة يوم المرض
- قد تكون هناك حاجة إلى أخذ جرعة إضافية من الأنسولين
- في حالة عدم التأكد، اتصل بقسم الفرز من أجل الحصول على المشورة على الرقم 1111 6456 (الخيار 2)

3

إذا كانت الكيتونات

↓ أقل من نسبة 0.6

- تابع مراقبة الجلوكوز
- فكر في تصحيح الأنسولين

4

- افحص نسبة السكر في الدم والكيتونات كل ساعتين حتى تختفي الكيتونات
- اشرب الماء من أجل البقاء رطبًا

المنتج من: طب مرض السكري والغدد الصماء. المرجع: 1634 © CAHS 2023
يمكن توفير هذه الوثيقة بأشكال بديلة بناءً على طلب شخص من ذوي الإعاقة.

إخلاء المسؤولية: هذا المنشور مخصص لأغراض التعليم العام والمعلومات.
اتصل بأخصائي رعاية صحية مؤهل للحصول على أي نصيحة طبية تحتاجها.
© ولاية غرب أستراليا، خدمة صحة الأطفال والمراهقين.