Dari

Perth Children's Hospital

Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

معالجه هیپو (گلوکز پایین)
برای اطفالی که پیچکاری دریافت میکنند

1

احساس میکنید کم انرژی هستید

یا



میزان گلوکز **زیر** 3.9 دارید

2

Glucodin بگیرید

3

15 دقیقه صبر کنید

4

خون بگیرید و میزان شکر خون
را ثبت کنید

5

اگر میزان گلوکز هنوز
زیر 3.9 **است**
مرحله 2 را تکرار کنید

5



اگر میزان گلوکز **بالاتر از** 3.9 **است**
یک مقدار غذا بخورید

تولید شده توسط: مرض شکر و هورمون شناسی. شماره مرجع: 1633 © CAHS 2023
این سند را می‌توان در قالب‌های جایگزین در صورت درخواست برای یک فرد دارای معیوبیت در دسترس قرار داد.

سلب مسئولیت: این نشریه برای اهداف آموزشی و اطلاع رسانی عمومی است.
برای هر گونه توصیه طبی مورد نیاز با یک متخصص مراقبت های صحی معتبر تماس بگیرید.
© ایالت استرالیای غربی، خدمات صحی اطفال و نوجوانان.