Dari

Perth Children's Hospital

Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

زمان تست کتون (ketones)

1



احساس مریضی میکنید **یا** میزان گلوکز زیر 15 دارید

2

کتون خون را چک کنید

3

اگر میزان کتون

بالای 0.6 باشد

- راهنمای مدیریت روز مریضی را دنبال کنید
- شاید به انسولین اضافی ضرورت شود
- اگر مطمئن نیستید، برای کسب مشوره با بخش تریاژ به شماره 1111 6456 (گزینه.2) زنگ بزنید.

3

اگر میزان کتون

زیر 0.6 است

- به نظارت کردن گلوکز ادامه دهید
- اصلاح کردن انسولین را درنظر بگیرید

4

- میزان گلوکز و کتون را هر دو ساعت تا زمان پاک شدن کتون چک کنید
- برای جلوگیری از کم آبی بدن آب بنوشید

تولید شده توسط: مرض شکر و هورمون شناسی. شماره مرجع: 1634 © CAHS 2023
این سند را می‌توان در قالب‌های جایگزین در صورت درخواست برای یک فرد دارای معیوبیت در دسترس قرار داد.

سلب مسئولیت: این نشریه برای اهداف آموزشی و اطلاع رسانی عمومی است.
برای هر گونه توصیه طبی مورد نیاز با یک متخصص مراقبت های صحی معتبر تماس بگیرید.
© ایالت استرالیای غربی، خدمات صحی اطفال و نوجوانان.