

ما بعد الإنتان

الإنتان - ما هو؟

الإنتان هو استجابة الجسم - العارمة للعدوى الموجودة بالفعل. يحدث هذا عندما يدافع الجسم العدوى ولكنه يبدأ في مهاجمة نفسه، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة وفشل الأعضاء. إنها حالة طبية طارئة تهدد الحياة وتتطلب علاجًا عاجلاً.

لمزيد من المعلومات حول الإنتان، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو الانتقال إلى موقع

<https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Sepsis>



بعد دخول طفلك المستشفى بسبب الإنتان

يؤثر الإنتان على - كل شخص بشكل مختلف. عندما يغادر الطفل والأسرة المستشفى، قد يظلون بحاجة إلى بعض الدعم، بما في ذلك:

- متابعة (المرضى الخارجيين) مع الأطباء والممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي النطق وأخصائيي التغذية وأخصائيي العلاج المهني و/أو الأخصائيين النفسيين.
- الأدوية المستمرة. قد يشمل ذلك المضادات الحيوية عن طريق الفم أو الوريد (IV) أو مخفف الألم أو أي دواء جديد آخر. إذا لزم الأمر، ستقوم المستشفى - في المنزل (HiTH) بزيارتك يوميًا لإعطاء طفلك المضادات الحيوية عن طريق الوريد. يجب مناقشة مدة العلاج بأي أدوية وكيفية الوصول إلى الإمدادات المستمرة معك قبل خروجك من المستشفى.
- يعاني بعض الأطفال من جروح تحتاج إلى ضمادات منتظمة. إذا لزم الأمر، ستأتي ممرضة إلى منزلك كل بضعة أيام وتقوم بإجراء هذه الضمادات.
- لن يتعافى بعض الأطفال إلى ما كانوا عليه في السابق لأنهم سيعانون من إعاقات دائمة. ستحتاج إلى دعم طويل الأجل من مقدمي الرعاية الصحية في المجتمع. سيتم ترتيب ذلك من قبل فريق الخروج من المستشفى الخاص بك.
- سيكون بعض الأطفال ضعفاء ويشعرون بالتعب ونقص الطاقة عند عودتهم إلى المنزل. قد يعني هذا أنهم سيحتاجون إلى الراحة في المنزل.

يعاني بعض الأطفال من مشاكل جسدية وعاطفية و- إنمائية طويلة الأمد تُعرف باسم متلازمة ما بعد الإنتان. ما زلنا نتعلم عن هذا في الأطفال.

تشمل أعراض متلازمة ما بعد الإنتان ما يلي:

- صداع أو آلام أخرى
- تغيرات في الشهية
- الشعور بالتعب أكثر من المعتاد
- تغيرات في أنماط النوم أو صعوبة في النوم
- ضعف العضلات
- تغيرات السلوك
- صعوبة في التركيز
- الخوف من الإجراءات الطبية و/أو المهنيين الصحيين.

قد تصاب العائلات بالصدمة بسبب دخول طفلها مصابا بالإنتان. قد لا يكون هذا واضحا إلا بعد أشهر وقد يحتاج الناس إلى دعم من الأصدقاء أو العائلة أو متخصص.

برنامج رعاية ما بعد الإنتان PCH

للمساعدة في دعمك أنت وعائلتك، سيتواصل معك أحد موظفي PCH. سيكونون موجهون الرعاية الخاص بك بعد الخروج. سيتم ترتيب مواعيد ربيع سنوية عبر الرعاية الصحية عن بعد لمراقبة تعافي طفلك ودعمك أنت وطفلك بعد الخروج من المستشفى. سيتم إرسال رابط SMS (رسالة نصية قصيرة) قبل كل موعد مع بعض الأسئلة حول كيفية سير حالة طفلك.

هل سيصاب طفلي بالإنتان مرة أخرى؟

لن يصاب معظم الأطفال بالإنتان مرة أخرى، ولكن هناك فرصة ضئيلة لحدوثه مرة أخرى. قد يكون لدى الطفل خطر متزايد للإصابة بالعدوى مرة أخرى. ويرجع ذلك إلى التغييرات في الجهاز المناعي للجسم بسبب الإنتان.

إذا كان طفلك يبدو أكثر مرضاً من المعتاد بالنسبة لك، فتق في حدسك، واطلب رعاية طبية عاجلة وأخبر الفريق الطبي أن طفلك قد أصيب بالإنتان من قبل.

أشياء يمكنني القيام بها لمنع الإنتان في المستقبل

- قم بتطبيق تدابير النظافة الأساسية مثل غسل يديك بالماء والصابون.
- تأكد من تحديث لقاحات طفلك.
- انتبه جيداً للدغات الحشرات وإصابات الجلد؛ راجع طبيبك العام إذا لم تتعافى أو بقيت حمراء وملتهبة ومتورمة.
- أخبر مدرستك وطبيبك العام وممرضة صحة الطفل وأي متخصصين صحيين آخرين يقومون بالمتابعة أن طفلك قد أصيب بالإنتان.
- كن على دراية بالأعراض، وثق في حدسك. أنت تعرف طفلك بشكل أفضل. إذا بدوا أكثر مرضاً من المعتاد، فاطلب الرعاية الطبية العاجلة، واطرح السؤال "هل يمكن أن يكون الإنتان هو السبب؟" العلاج المبكر ينقذ الأرواح.

جهات اتصال مفيدة

- إذا كنت بحاجة إلى دعم أو كنت قلقاً بشأن طفلك بعد دخوله المستشفى، ولم تكن حالة طارئة، فيرجى الاتصال ببرنامج الإنتان (CAHS) (pch.sepsis@health.wa.gov.au) أو طبيبك العام أو مناقشة أي مجالات مثيرة للقلق في موعد - المرضى الخارجيين التالي.

- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الدواء الذي يتناوله طفلك، فيرجى الاتصال بخدمة معلومات أدوية (PCH.PharmacyMedicinesInformationService@health.wa.gov.au). سيسعى الصيدلي للرد عليك في غضون يوم عمل واحد. إذا كنت بحاجة إلى رد عاجل، فيرجى الاتصال بالرقم **08 6456 0190** وتحديد الخيار **1**. هذه الخدمة متوفرة من الساعة 8:30 صباحاً إلى 5:00 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة، ويقدم الصيدلة المساعدة بكل سرور حول أي أسئلة قد تكون لديكم بشأن أدوية طفلك.

- بدلاً من ذلك، قم بزيارة صيدلية المجتمع المحلي أو الطبيب العام أو اتصل ببرنامج الإنتان CAHS أو فريق الخروج من المستشفى الخاص بك.
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول علامات وأعراض الإنتان، فيرجى الانتقال إلى صفحة عائلة المصابين بالإنتان: <https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Sepsis> أو مسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه.

Child and Adolescent Health Service
15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009. Telephone:
(08) 6456 2222
Produced by: [Sepsis](#)
Ref. 1741.1|© CAHS 2024



Government of Western Australia
Child and Adolescent Health Service

إخلاء المسؤولية: هذا المنشور هو لأغراض التعليم العام والمعلومات. اتصل بأخصائي رعاية صحية مؤهل للحصول على أي مشورة طبية مطلوبة.
© ولاية أستراليا الغربية، خدمة صحة الطفل والمراهق.

يمكن توفير هذه الوثيقة في تنسيقات بديلة عند الطلب -
للأشخاص ذوي الإعاقة.